第28卷 第2期 昆 虫 学 报 Vol. 28, No. 2
1985年5月 ACTA ENTOMOLOGICA SINICA May, 1985

樟蚕姬蜂属一新种

（膜翅目：姬蜂科，肿跗姬蜂亚科）

王 淑 芳
（中国科学院动物研究所）

本文记述樟蚕姬蜂属 *Habronyx* Foerster 指名亚属 *Habronyx* （s. str.）中的一新种。标本采自北京潭柘寺。模式标本保存在中国科学院动物研究所。本文特征图由陆伯林同志绘制。

拟榨蚕软姬蜂 *Habronyx subinsidiator* 新种

雌蜂：前翅长12毫米。头、胸黑色。触角柄节、梗节前面、脸、唇基、上颚除端齿外、眼眶外侧下端、触角鞭节、前足、中足、后足除基节及胫节端部外、翅基片、腹部除第二节背部纵斑外均黄至红黄色。翅脉褐色，翅痣浅褐，翅浅褐透明。体被致密短毛。头宽与胸宽相等；侧单眼间距与侧单眼和复眼间距相等；额具明显皱纹，中央具纵脊；触角54节，鞭节第4节长约为宽1.7倍；脸平坦具细密刻点，上端在触角窝间呈突起状；唇基几乎光滑无刻点，端缘中央具尖齿；上颚上端齿长于下端齿；上颊最宽处为复眼宽的0.75倍，下端变窄。前胸背板背方及后肩角具明显刻点，背侧方及下方具不规则皱纹。中胸盾片具细密刻点，盾纵沟处呈刻纹状，伸至盾片末端；中胸侧板上刻点较盾片刻点，稍大而稀，胸腹侧脊伸至侧板中部稍下方，翅基下脊下面及胸腹侧脊前面具皱纹，中胸腹板后横脊间断；并



图1 拟榨蚕软姬蜂 *Habronyx subinsidiator* Wang, sp. nov.
a. 头部侧面观。 b. 头部背面观。 c. 前翅

本文于1983年6月收到。

胸腹节具网状皱褶，其末端抵达后足基节中部。小盾片基半部具细刻点，端半部具细刻纹。后足第 1 转节长为第 2 转节长 1.2 倍(下面观),后足基跗节长为第 2 节 2.8 倍，后足爪简单。肘间横脉与第 2 迴脉间距为肘间横脉的 0.4—0.5 倍;后小脉在中部稍下方曲折。腹部第 1 节长稍短于第 2 节,第 3 节短于第 4 节，长于第 5 节，产卵管鞘长约为第 2 腹节长 0.57 倍。

正模♀,北京潭柘寺，1975. VII. 24，吴燕如采。副模 4♀，地点、时间同上。

本种与榨蚕软姬蜂 *Habronyx insidiator* Smith 相似,但有下面区别：上颊最宽处为复眼宽的 0.75 倍,其下端变窄(后种为 0.9 倍,下端不变窄)；侧单眼间距与侧单眼和复眼间距相等(后种侧单眼间距为侧单眼与复眼间距的 0.6 倍);触角 54 节(后种 62 节)；并胸腹节末端抵达后足基节中部(后种只达后足基节 0.33 处)；后足基跗节长为第 2 跗节 2.8 倍(后种只 2.3 倍)。

作者在整理樟蚕姬蜂属 *Habronyx* 过程中,得到英联邦昆虫研究所 I. D. Gauld 博士的帮助,借阅了本属旧北区的部分种类,借此致以衷心感谢。

A NEW SPECIES OF *HABRONYX* FOERSTER FROM BEIJING, CHINA (HYMENOPTERA: ICHNEUMONIDAE, ANOMALONINAE)

WANG SHU-FANG
(Institute of Zoology, Academia Sinica)

In this paper a new species of the genus *Habronyx* Foerster is described from Beijing, China. The type specimens are preserved in the Institute of Zoology, Academia Sinica.

***Habronyx subinsidiator* sp. nov.**

Female: Front wing 12 mm long. This species is very similar to *Habronyx insidiator* Smith, but it is different from the latter by: widest part of temple about 0.75x as wide of eye, down apex narrowed (the latter 0.9x, down apex not narrowed); OOD is equal IOD (the latter OOD 0.6x as IOD); antenna 54 segments (the latter 62); apex of propodeum reaching to middle of hind coxae (the latter reaching to 1/3); hind basitarsus 2.8x as 2nd tarsal segment (the latter only 2.3x).

Holotype ♀, Beijing (Tanzhei), China, 25. VII. 1975, paratypes 4♀, ditto.